

Pourquoi des interdictions d'accès aux animaux de compagnie sur les plages ?

Risque sanitaire

Impact sur le classement de la zone de baignade (ou de conchyliculture)

Certaines plages sont suivies, chaque été, par l'ARS qui y fait des analyses d'eau.

Les plages concernées sont celles qui sont fréquentées par les baigneurs (et autres activités nautiques).


Un seul mauvais résultat d'analyse peu bouleverser le classement d'un site !

????!!

Ça sera mieux la prochaine fois !?

Pas tout à fait :

- Les animaux domestiques sont très nombreux et sont nourris avec une alimentation riche en protéines¹ (risque de sur-fertilisation des sols → changement de végétation (*dunes*) → végétation dégradée, perte de biodiversité).
- Une masse d'eau importante sera polluée pouvant rendre les coquillages impropres à la consommation² (contamination bactériologique).
- Ces animaux sont vecteurs de zoonoses (importance de bien les vermifuger également)³.



Pour la baignade, le classement est réalisé en prenant les résultats obtenus sur 4 ans (3 ans pour la pêche à pied) !


- ⇒ Les zones touristiques peuvent être très impactées économiquement par un mauvais résultat !
- ⇒ Les professionnels qui dépendent de ces activités aussi (loueurs, restaurateurs, campings, conchyliculteurs...) !



Cf carte des sites de baignade suivis
Cf Site @ : [Pêche à Pied Responsable](#)

Oui, mais c'est naturel !?

La mer est là pour nettoyer



Impact sur la biodiversité

D'avril à Octobre, des oiseaux nichent sur le littoral. D'octobre à avril, ce sont les oiseaux hivernants et migrateurs qui fréquentent le littoral pour se nourrir et se reposer.




Et les déchets !!!

C'est aussi un enjeu qui est également travaillé. Par ailleurs, la réduction des autres sources de pollution bactériologique (assainissement, effluents agricoles, ...) est aussi une priorité pour les collectivités qui réalisent des investissements importants dans ce domaine.⁶

TOUS CONCERNÉS, TOUS RESPONSABLES

Mais, les oiseaux, c'est fait pour voler !




En effet, mais les dérangements répétés les font puiser dans leurs réserves, menaçant leur survie et celle de leurs œufs/poussins.



Site : C-monspot ⁴

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6MJ0E_Nq6LS6esMQj5xOqagCwZAqE06Y



Gravelot _source : GEOCA⁵

Où aller avec mon chien ?



Cf carte d'itinéraires de balades et de lieux touristiques où les animaux de compagnie sont acceptés + partie « Bonnes pratiques »

Références

¹De Frenne, P., Cougnon, M., Janssens, G. P. J., & Vangansbeke, P. (2022). Nutrient fertilization by dogs in peri-urban ecosystems. *Ecological Solutions and Evidence*, 3, e12128. <https://doi.org/10.1002/2688-8319.12128>

²SAGE Baie de Lannion (affiche de sensibilisation « Nom d'un chien, Nom d'un cheval, Nom d'un chenapan ! »)

³Seymour, J., Williams, N., & Siboni, N. (2020). Microbial source-tracking to assess water quality issues at Rose Bay.

Helminthes canins (Luca Massetti, Anke Wiethoelter, Phillip McDonagh, Louise Rae, Lara Marwedel, Frederic Beugnet, Vito Colella, Rebecca J. Traub, Faecal prevalence, distribution and risk factors associated with canine soil-transmitted helminths contaminating urban parks across Australia, *International Journal for Parasitology*, Volume 52, Issue 10, 2022, Pages 637-646, ISSN 0020-7519, <https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2022.08.001>).

⁴Le dérangement - C-monspot - soyons sport, soyons nature

⁵GEOCA - Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes-d'Armor - GEOCA - Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes-d'Armor

⁶Accueil - Sage - Baie de Lannion (sage-baie-lannion.fr)

Précisions de l'ARS (réunion LTC du 19/06/23)

↳ Contamination engendrée par une déjection canine

Il est difficile de prédire la durée de contamination engendrée par une déjection canine, celle-ci pouvant aller de quelques heures à plusieurs jours en fonction de la nature de la déjection, des conditions d'ensoleillement, de température de l'eau et de salinité.

Précisions apportées par l'ARS a posteriori :

*En matière d'approche sanitaire, de façon générale, les déjections animales (comme humaines) contiennent des germes fécaux, pouvant être associés à des agents pathogènes. Pour les déjections canines, leur niveau de contamination est évalué à $8.3 \cdot 10^9$ * coliformes thermotolérants et $1.0 \cdot 10^{11}$ entérocoques fécaux par jour selon la littérature scientifique. Toutes les déjections sont donc susceptibles d'altérer la qualité de l'eau de façon directe ou indirecte (sur les plages mais aussi via les eaux de ruissellement des surfaces urbaines et agricoles), même si les mécanismes de contamination ne sont pas aussi simples (tout dépend des quantités de déjections, de leur état de fraîcheur, de leur dilution dans la masse d'eau, des conditions météo-océaniques, etc.). Pour cette raison, l'ARS a toujours porté un discours visant à réduire autant que possible la fréquentation animale sur les zones de baignade en période de forte fréquentation des sites. Tout ceci conforte donc les mesures de prévention des risques les plus protectrices, spécialement en période estivale, l'interdiction stricte en étant la meilleure concrétisation.*

N.B. : $8.3 \times 10^9 = 8\,300\,000\,000$
 $1.0 \times 10^{11} = 100\,000\,000\,000$